| Markvegetationstyp | Definition |
|---|---|
| Högörttyp utan ris<br>(HÖUR) | Markytan i stort sett helt täckt av smörbollar, älgört och midsommarblomster. Den senare typart för högört endast i norra Sverige. |
| Högörttyp med ris<br>(HÖMR) | Bördig, norrländsk granståndort. Här växer bl.a. nordisk stormhatt, tolta och högvuxna ormbunkar. Blåbärsriset täcker mer än ¼ av markytan. |
| Lågörttyp utan ris<br>(LÖUR) | Befintliga typarter: harsyra, ekbräken och ekorrbär. Ris på mindre än ¼ av markytan. |
| Lågörttyp med ris<br>(LÖMR) | Vitsippa, harsyra och ekorrbär utgör mer än 5 % av fältskiktet. Ris på mer än ¼ av markytan. |
| Mark utan fältskikt<br>(UF) | Oftast på ståndorter med mycket välslutna bestånd. |
| Bredbladig grästyp + örnbräken<br>(BRGR) | Utöver bredbladiga gräsväxter ingår också örnbräken som typart. |
| Smalbladig grästyp<br>(SMGR) | Kruståtelns täckningsgrad utgör med än ¼ av befintligt fältskikt. |
| Starr-fräkentyp<br>(STA-FRÄ) | Befintliga typarter: skogsfräken och klotstarr. |
| Blåbärstyp<br>(BLÅ) | Blåbärsriset dominerar – örterna från HÖ och LÖ täcker mindre än ¼ av befintligt fältskikt. |
| Lingontyp<br>(LING) | Lingon och blåbär har tillsammans större täckning än kråkbär och ljung. |
| Kråkbär-ljungtyp<br>(KRÅK-LJU) | Kråkbär och ljung har tillsammans betydligt store täckning än lingon. |
| Fattigristyp<br>(FA-RIS) | Befintliga typarter: odon och skvattram. |
| Lavrik typ<br>(LAVRIK) | Lavarna täcker mer än ¼, men mindre än ½ av befintligt bottenskikt. |
| Lavtyp<br>(LAV) | Lavarna täcker mer än ½ av befintligt bottenskikt. |

Källa: Skogsmarkens ekologi, Ståndortsanpassat skogsbruk del 2 – tillämpning
ISBN: 91-85748-69-2